


Infinitesimales

Hier wächst Ihr Wissen über das
unendlich Kleine



Der Modellierungskreislauf

Ein erfundenes Beispiel:

16 Uhr Unfall mit Fahrerflucht in Hann. Münden

Ein Zeuge glaubt einen Transporter mit reichlich
Werbeschrift gesehen zu haben.




Der Besitzer behauptet er sei um 16 Uhr gar nicht in
Hann.Münden gewesen.

Der Modellierungskreislauf

Um 15 Uhr war er nachweislich noch in Bodenwerder, 80 km entfernt.

Der Fahrtenschreiber zeigt:




Reale Situation

Länge der gefahrenen Strecke ist gesucht.

Der Modellierungskreislauf


Um 15 Uhr war er nachweislich noch in Bodenwerder, 80 km entfernt.

Der Fahrtenschreiber zeigt:



Reale Situation

Länge der gefahrenen Strecke ist gesucht.




mathematisches Modell

Fläche unter der Modellkurve gesucht.

Der Modellierungskreislauf


Um 15 Uhr war er nachweislich noch in Bodenwerder, 80 km entfernt.

Der Fahrtenschreiber zeigt:



Reale Situation

Länge der gefahrenen Strecke ist gesucht.



mathematisches Modell

Fläche unter der Modellkurve gesucht.


mathematische Lösungsidee

$$s = \int_0^{0.75} v(t) dt$$

Der Modellierungskreislauf

Um 15 Uhr war er nachweislich noch in Bodenwerder, 80 km entfernt.


Der Fahrtenschreiber zeigt:



Reale Situation



Länge der gefahrenen Strecke ist gesucht.



mathematisches Modell



Fläche unter der Modellkurve gesucht.

mathematische Lösungsidee

0.75

$$s = \int_0^{0.75} v(t) dt$$

mathematische Antwort


$$s = 60 \text{ km}$$



Der Modellierungskreislauf


Um 15 Uhr war er nachweislich noch in Bodenwerder, 80 km entfernt.

Der Fahrtenschreiber zeigt:



Reale Situation

Länge der gefahrenen Strecke ist gesucht.



mathematisches Modell

Fläche unter der Modellkurve gesucht.

mathematische Lösungsidee

0.75

$$s = \int_0^{0.75} v(t) dt$$

mathematische Antwort

$$s = 60 \text{ km}$$

Funktionen werden zum Werkzeug

Man erhält Antworten beim

Blick auf „das Ganze“ mit dem **Integral**

integer (lat.)= ganz

pane integrale (it.) = Vollkornbot

$$\int f(x) dx$$

Funktionen beschreiben
Zusammenhänge

Man erhält punktuelle Antworten

mit dem **Differential**

$$df, \quad \frac{dy}{dx}, \quad f'(x)$$

Das Integral

$$\int f(x) dx$$



$$\int_a^b f(x) dx$$

Man erhält Antworten beim

Blick auf „das Ganze“ mit dem **Integral**

integer (lat.)= ganz

pane integrale (it.) = Vollkornbrot



Das Riemannsches Integral

$$\int_a^b f(x) dx$$

Bernhard Riemann

Abi 1846

Johanneum Lüneburg



Originaltext aus „Gesammelte Werke“

Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.


4.

Die Unbestimmtheit, welche noch in einigen Fundamentalpunkten der Lehre von den bestimmten Integralen herrscht, nöthigt uns, Einiges voraufzuschicken über den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.

Also zuerst: Was hat man unter $\int_a^b f(x) dx$ zu verstehen?

10

$\int_a^b f(x) dx$ Riemannsches Integral



Bernhard Riemann

Abi 1846

Johanneum Lüneburg

Hat sie diese Eigenschaft nicht, so hat $\int_a^b f(x) dx$ keine Bedeutung.

die Fkt f

, bei jeder Zerlegung denselben Grenzwert zu haben,

Originaltext aus „Gesammelte Werke“

Das Integral als verallgemeinertes Produkt

v konstant $s = v \cdot t$ $v = v(t)$ variabel

Geschwindigkeit Weg Zeit

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

Integral für 3D-Flächen, Volumen, Schwerpunkt, Bilanzen....

12

Das Integral als verallgemeinertes Produkt

$$v \text{ konstant} \quad s = v \cdot t \quad v = v(t) \text{ variabel}$$

Geschwindigkeit Weg Zeit

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

$$F \text{ konstant} \quad W = F \cdot s \quad F = F(s)$$

Kraft Arbeit Weg

$$W = \int_a^b F(s) ds$$

Integral für 3D-Flächen, Volumen, Schwerpunkt, Bilanzen....

13

Das Integral als verallgemeinertes Produkt

$$v \text{ konstant} \quad s = v \cdot t \quad v = v(t) \text{ variabel}$$

Geschwindigkeit Weg Zeit

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

$$F \text{ konstant} \quad W = F \cdot s$$

$$F = F(s)$$

Kraft Arbeit Weg
 Energie

$$W = \int_a^b F(s) ds$$



$$R \text{ konstant} \quad U = R \cdot I \quad R = R(I) \text{ variabel}$$

Widerstand Spannung Stromstärke

$$U = \int_a^b R(I) dI$$

Integral für 3D-Flächen, Volumen, Schwerpunkt, Bilanzen....

Das Integral für den verallgemeinerten Mittelwert




Wetter Temperaturverlauf



$$T_{\text{mittel}} = \frac{1}{4} (T_7 + T_{14} + 2 \cdot T_{21})$$

Integral für Mittelwert und Bilanzen....

Das Integral für den verallgemeinerten Mittelwert




Ist die Modellierung der
Metereologen
nicht viel zu grob?????

$$T_{\text{mittel}} = \frac{1}{4} (T_7 + T_{14} + 2 \cdot T_{21})$$

Flächenbilanz=0

Integral für Mittelwert und Bilanzen....

Das Integral für den verallgemeinerten Mittelwert





$$T_{\text{mittel}} = \frac{1}{4} (T_7 + T_{14} + 2 \cdot T_{21})$$

Flächenbilanz=0

Integral für Mittelwert und Bilanzen....



Das Integral für den verallgemeinerten Mittelwert




$$\text{Mittelwert} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Integral für 3D-Flächen, Volumen, Schwerpunkt, Bilanzen....



Eigenschaften des Integrals




Sind die Werte von f im ganzen Intervall negativ, dann ist auch das Integral negativ.




Eigenschaften des Integrals





Das Integral ist eine Flächenbilanz mit negativen und positiven Flächen.




Sind die Werte von f im ganzen Intervall negativ, dann ist auch das Integral negativ.




Eigenschaften des Integrals



Das Integral ist eine Flächenbilanz mit negativen und positiven Flächen.




Beim Vertauschen der Grenzen ändert sich das Vorzeichen des Integrals




Sind die Werte von f im ganzen Intervall negativ, dann ist auch das Integral negativ.

Übungen zum Integral




$$\int_a^b f(x) dx$$

Intervall [A,B]




①




②

$\pm 8, \pm 20, \pm 24$


mögliche Werte




③




④



⑤




⑥





⑦

Übungen zum Integral








$$\int_a^b f(x) dx$$


Intervall [A,B]



$\pm 8, \pm 20, \pm 24$


mögliche Werte






Die Integralfunktion

„Teppich-Abroll-Funktion“ $F(x, a) := \int_a^x f(t) dt$







Die Integralfunktion

$$F(x, a) := \int_a^x f(t) dt$$


„Teppich-Abroll-Funktion“



Ordinate von P zeigt die abgerollte Fläche an.



Nochmal die Teppichabrollfunktion




dieser Wert ist der Flächeninhalt des Teppichs, abgerollt bis $x=5$

f als
Rand des
Teppichs

$$F(x) = \int_2^x f(t) dt$$

Integralwert
zum Start 2

die Intergralfunktion F von f = „Teppichabrollfunktion“



f als Ableitung
von F

dasselbe!

f als Randfkt.
für den
abgerollten Teppich

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$$f(x) = F'(x)$$


d. h. Alle Integralfunktionen F zu f mit beliebigem Start
haben ihr f auch als Ableitung. Sie heißen daher auch

„Stammfunktionen“ von f ,

f blau

sie unterscheiden sich nur um eine
additive Konstante c . Man schreibt:

$$F(x) = \int f(x) dx + c$$




30


Optimierung als Ziel




2-Liter-Pokal




Silberverbrauch






Optimierung als Ziel



Wirtschaftsfunktionen







Wasser in der Mühle



Im kegelförmigen Dach einer Mühle soll ein zylindrischer Wasserbehälter mit möglichst großem Volumen eingebaut werden.

Wasser in der Mühle



Funktionen Optimum 3 D

